

Estudio de la **preeclampsia**



Estudio de la **preeclampsia**

¿Qué es?

La preeclampsia es una enfermedad asociada a la hipertensión durante el embarazo que puede aparecer a partir de las 20 semanas de gestación y que produce complicaciones tanto en la madre como en el feto; como desprendimiento de placenta, parto prematuro, falla orgánica o convulsiones.

La preeclampsia es una complicación grave entre el 3 y el 5% de los embarazos, siendo necesaria la inducción del parto antes de la 34^a semana de gestación (preeclampsia precoz) o al final del embarazo (preeclampsia tardía).

Elaboramos un informe personalizado indicando el diagnóstico de la existencia de preeclampsia o del riesgo de desarrollarla en las próximas semanas.



Síntomas

- **Hipertensión** (sistólica y diastólica) en mujeres anteriormente normotensas.
- **Proteinuria** (presencia de proteínas en la orina en mayor concentración de lo normal).
- **Edema** (acumulación de líquido).
- **Disminución de la función renal.**
- **Afectación hepática.**
- **Dolores de cabeza.**


La detección temprana y la clara estratificación del riesgo facilita la toma de decisiones para asegurar el bienestar de la madre y del feto.

Con el estudio predictivo y diagnóstico de la preeclampsia podemos identificar si la embarazada tiene riesgo de desarrollar el síndrome y su potencial peligrosidad para el bebé.



¿Para qué mujeres está indicado?

Esta prueba está indicada para todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 20 de embarazo, en Especial si presentan algunos de los siguientes factores de riesgo:

- **Primer embarazo o primer embarazo con nueva pareja**
 - **Preeclampsia en embarazo anterior**
 - **Embarazo múltiple**
 - **Embarazo mediante fertilización in vitro**
 - **Diabetes mellitus tipo I**
 - **Obesidad**
 - **Mujeres mayores de 40 años**
 - **Hipertensión**
 - **Problemas de riñón**
 - **Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares**
 - **Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos**
 - **Lupus eritematoso**
- 

Proceso



Requiere una sencilla muestra de sangre.



Envío del informe en 2 días laborables.



Recepción de la muestra en nuestro laboratorio.



Tu médico te explicará los resultados.

Realizar el examen **a partir de la semana 20 de embarazo.**

- **No es necesario** estar en ayunas.
-

Resultados

Los resultados del estudio son imprescindibles para que el médico pueda actuar a tiempo, a través de un diagnóstico se aportan dos posibles resultados:

Diagnóstico de preeclampsia

o

Posible riesgo

Diagnóstico de preeclampsia: evidencia del síndrome, valoración de la gravedad y progresión; permitiendo una rápida actuación médica a favor de la madre y el bebé.

Posible riesgo: riesgo de desarrollar o no preeclampsia en las 4 semanas siguientes, de manera que la embarazada se mantiene bajo vigilancia médica.

PREECLAMPSIA PRECOZ

Semana gestacional 20-33+6 días

sFlt-1/PIGF > = 85	Diagnóstico	La mujer tiene preeclampsia. Especificidad 99.5%
sFlt-1/PIGF < 85 > = 38	Predicción: Inclusión en próximas 4 semanas	Alto riesgo de desarrollar preeclampsia en las próximas 4 semanas. Valor predictivo Positivo: 38.6%
sFlt-1/PIGF < 38	Predicción: Descarte en la próxima semana	La mujer no desarrollará preeclampsia en la próxima semana. Valor predictivo Negativo: 99.1%

PREECLAMPSIA TARDÍA

Semana gestacional 34 hasta final del embarazo

sFlt-1/PIGF > = 110	Diagnóstico	La mujer tiene preeclampsia. Especificidad 99.5%
sFlt-1/PIGF < 110 > = 38	Predicción: Inclusión en próximas 4 semanas	Alto riesgo de desarrollar preeclampsia en las próximas 4 semanas. Valor predictivo Positivo: 38.6%
sFlt-1/PIGF < 38	Predicción: Descarte en la próxima semana	La mujer no desarrollará preeclampsia en la próxima semana. Valor predictivo Negativo: 99.1%

La medición de la ratio con Elecsys sFlt-1/PIGF es una herramienta fiable para identificar a aquellas mujeres con alto riesgo de desarrollar preeclampsia en las próximas 4 semanas y que requieren una vigilancia más estrecha. Por otro lado, permite detectar aquellas mujeres con sospecha de preeclampsia que no van a desarrollar la enfermedad en una semana. La ratio sFlt-1/PIGF sirve para diferenciar preeclampsia/HELLP de diferentes formas de trastornos hipertensivos del embarazo.



laboratoriosdoctorgrasa



Laboratorios Doctor Grasa

Contacto de Atención al Paciente

C. Francisco Vitoria 5, local 50008 Zaragoza

976 21 80 49

pacientes@doctorgrasa.com

www.doctorgrasa.com
